

Actueel WG/GA van het middel Prophyl S, 16671 N

3 april 2024

A.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

- bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels, virussen\* en parasitaire protozoa op harde oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportvoertuigen voor dieren;
- bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in ontsmettingsbaden voor schoeisel.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.  
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

*\*Een volledige virusclaim is gedefinieerd in EN14885. Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op [www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl) onder 'uitleg virusclaim'.*

B.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### **Harde oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten**

Oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Verdun Prophyl S in water al naargelang het gewenste effect. Desinfecteer door de oplossing bij lage druk te spuiten met een dosering van 100 ml/m<sup>2</sup>, totdat de vloeistof van de oppervlakken loopt. Laat inwerken volgens de gespecificeerde inwerktijd.

##### Algemene veiligheidsinstructie:

Bij mengen en laden van het product handschoenen, beschermende kleding en oog/gelaatbescherming dragen. Niet toepassen op oppervlakken die in aanraking komen met etenswaren of voer. Reinig de toepassingsapparatuur met water. Ruimtes niet opnieuw betreden voordat het product opgedroogd is. Behandelde oppervlakten die in contact kunnen komen met dieren naspoelen met water.

##### *Bacteriën en gisten*

Dosering: 0,6% v/v (6 ml product aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: 120 minuten

Bescherming bij toepassen: handschoenen en beschermende kleding.

##### *Mycobacteriën en schimmels*

Dosering: 1,5% v/v (15 ml product aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: 120 minuten

Bescherming bij toepassen: handschoenen en beschermende kleding.

##### *Virussen*

Dosering: 4% v/v (40 ml product aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: 120 minuten

Bescherming bij toepassen: handschoenen, beschermende kleding en adembescherming (beschermingsfactor 4).

*Parasitaire protozoa*

Dosering: 5% v/v (50 ml product aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: 120 minuten

Bescherming bij toepassen: handschoenen, beschermende kleding en adembescherming (beschermingsfactor 4).

### **Ontsmetting van schoeisel**

Zorg dat de capaciteit van de ontsmettingsbaden voor schoeisel ongeveer 10 tot 15 l bedraagt, met een minimumhoogte van 10 cm. Vul de ontsmettingsbaden voor schoeisel met Prophyl S-gebruikoplossing en plaats ze bij de ingang van elk gebouw op een plaats die beschut is tegen slechte weersomstandigheden. Dompel de eerder gereinigde (geborstelde) schoenzolen in het voetontsmettingsbad. Laat de oplossing 1 minuut inwerken bij ten minste 10°C. Vervang de oplossing na 100 paar schoenen of wanneer er zichtbare verontreiniging is. Vanwege milieurisico mag er niet vaker dan 1x per week gebruikoplossing voor een ontsmettingsbad voor schoeisel worden aangemaakt.

Algemene veiligheidsinstructie:

Bij mengen en laden van het product handschoenen, beschermende kleding en oog/gelaatbescherming dragen.

*Bacteriën en gisten*

Dosering: 2% (20 ml product aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: 1 minuut

Bescherming bij toepassen: geen specifieke eisen.